



Рекомендации по посадке и уходу

Уход за вегетирующими саженцами до посадки.

Не допускать попадания солнечных лучей на корневую систему саженца (Если контейнер прозрачный, то притенить его). Поливать саженец по мере высыхания верхнего слоя грунта в контейнере. При заполнении корнями всего контейнера рекомендуется перевалить его в контейнер большего размера. За две недели до посадки саженец закаляют ультрафиолетом в утреннее и вечернее время (во время слабой активности солнца).

Посадка вегетирующих саженцев.

Для посадки нужно выбрать хорошо прогреваемое солнцем место, не затененное деревьями и зданиями. Чем больше солнца, тем лучше плодоношение и качество плодов. Виноград сажается рядами. Ряды желательно располагать с севера на юг. Оптимальное расстояние между рядами 2 м, между кустами в ряду 3 м. Вдоль каждого ряда устанавливаются столбы через 3 метра. По столбам натягиваются несколько рядов проволоки через 40 см. При посадке вдоль стен, заборов, беседок используется одноплоскостная шпалера с козырьком или аркой. Расстояние между кустами 2-3 метра. Главное условие – освещенность кустов солнцем.

Подготовка посадочных ям.

Размеры ямы – 80х80х80. При выкапывании ямы слои земли сложить в отдельные кучки. Нижние 20 см ямы заполняются смесью чернозема, перегноя с 3 ведер, минерального удобрения (суперфосфат 300 гр, сернокислый калий 150 гр). Следующие 20 см заполняются верхним слоем земли. Пролить водой. Посадить саженец. Высаживать «зеленый» саженец в грунт, когда минует угроза возвратных заморозков. Саженец после посадки на 3-7 дней притенить от прямых солнечных лучей.

Формирование куста.



В 1 год выращиваем 1-2 побега, остальное удаляется. Осенью укорачиваем до 0.5 – 1 метра. Укрывая на зиму, можно полностью засыпать землей. Весной оставляем 2-4 побега, растущих из нижних почек, расположенных ниже уровня почвы на 10-20 см. В течение сезона пасынки укорачиваем на 1-4 листа для лучшего урожая в будущем году.

Нагрузка куста зелеными побегами.

Весной прошлогодние побеги, а ныне плодоносящие лозы, подвязываем на нижнюю проволоку. После вырастания побегов из почек на 20-30 см, делаем обломку слабых, двойников и холостых (без соцветий) побегов. Оставляем сильные побеги с соцветиями через 10-15 см друг от друга.

ВЫВЕДЕНИЕ БЕСШТАМБОВОЙ ВЕРХНОЙ ФОРМИРОВКИ

- а** саженец после посадки на постоянное место
- б** куст осенью 1 года и 2 года весной до обрезки
- в** куст весной 2 года после обрезки
- г** куст осенью 2 года до обрезки
- д** куст весной 3 года после обрезки
- е** куст осенью 3 года после обрезки на плодоношение



Нагрузка урожая.

На крупноплодных сортах на каждом побеге оставляем по одной грозди. Самой грубой ошибкой является нагрузка урожаем на 2 и 3 год. Это время формирования, а не плодоношения куста. На 2 год можно оставить несколько ягод, на 3 год – небольшие кисти. В противном случае можно погубить куст.

Обрезка плодоносящего куста.

Обрезка выполняется как можно позже, после первых заморозков. Чем дольше продержится лист, тем лучше лоза подготовится к зиме. Закалка лозы очень важна. Для куста, который занимает шпалеру длиной 3 метра, достаточно 6 хорошо вызревших побегов, толщиной не тоньше карандаша и длиной по 80 см. Остальные побеги удаляем.

Укрытие на зиму и раскрытие куста.

Сроки укрытия – конец октября, начало ноября. Обрезанные кусты связываются в фашинки (пучки). Опрыскать железным купоросом 400 гр на 10 литров воды. Прижать фашинки к земле. Покрыть тонким слоем земли. Сверху расстелить полиэтиленовую пленку, ее края придавить землей. Чтобы не было запревания, пленку укрыть непрозрачным материалом или для укрытия применять другой материал типа изолайф, дорнит и т.д. Самое важное помнить, что корни боятся мороза более -5 градусов, а лоза -20 -25 градусов.

О болезнях и подкормке.


Основные болезни – милдью и оидиум. От Милдью (парша или ложная мучнистая роса; белый налет с нижней стороны листа) лечатся с помощью медесодержащих препаратов таких как «хом», «ордан», «редомил голд», «танос» и др. Оидиум (мучнистая роса, как на крыжовнике или смородине) убирают серосодержащими препаратами: «топаз», «теовит джет», «колосаль про», «толендо» и др. Подкормки проводят согласно фазам роста растения, внося под корень и обрабатывая растение по листу или применять органическое удобрение для винограда от Органик Микс пачку 850 г на куст в начале сезона.

ВАЖНО!

Дозировки и методы внесения препаратов и удобрений соблюдать строго по инструкциям на упаковке.



СХЕМА КУСТА



**Данилюк
Пётр Петрович**

г. Ульяновск, пос. Ленинский,
ул. Рябиновая, д. 40
тел.: 8-917-628-21-08
www.vinograd73.ru

Приглашаю на ежегодную дегустацию винограда (более 100 сортов) в сентябре. Подробности на сайте или по телефону.

